



Behandling med colchicin

HANDELSNAVN: _____

Hvad er colchicin?

Colchicin er det virksomme stof i præparatet af samme navn og i præparatet Colrefuz.

Hvilke sygdomme behandles med colchicin?

Colchicin bruges mod urinsyreigt, også kaldet podagra eller arthritis urica.

Colchicin bruges ved akutte anfald af urinsyreigt, så du skal starte behandlingen, så snart du mærker, at anfaldet er ved at starte.

Colchicin kan også forebygge akutte anfald under de første måneders behandling med urinsyresænkende medicin (f.eks. allopurinol).

Colchicin kan også anvendes ved andre sjældnere gigttilstande.

Hvordan virker Colchicin?

Colchicin dæmper den betændelsesreaktion (inflammation), der kan opstå ved forskellige gigtsygdomme.

Colchicin ændrer ikke koncentrationen af urinsyre i blodet. Colchicin kan således ikke fjerne aflejringer af urinsyre i huden, senerne eller i leddene.

Hvor længe gives behandlingen?

Ved akutte anfald gives colchicin dagligt indtil anfaldet med ledsmerter er ovre.

Ved anvendelse af colchicin under samtidig opstart af urinsyresænkende lægemiddel gives colchicin typisk i 3-6 måneder.

Hvordan tages colchicin?

Colchicin tages som tabletter (0,5 mg), sædvanligvis 2-3 gange dagligt ved anfald, og 2 gange daglig ved opstart af urinsyresænkende behandling. Dosis er individuel fra person til person og afhænger blandt andet af din alder, din

nyrefunktion, dine symptomer og eventuelle bivirkninger.

Ved andre sjældnere gigtsygdomme kan dosis være en anden, men dette vil du blive orienteret om af din reumatolog.

Det har ingen betydning om du tager colchicin sammen med et måltid eller ej.

Hvordan opbevares colchicin?

Colchicin opbevares bedst i den originale emballage beskyttet mod fugt.

Opbevares ved stuetemperatur.

Hvis jeg har glemt at tage colchicin

Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du ikke tage to på én gang. Tag i stedet din næste tablet på det tidspunkt du plejer, og fortsæt som før.

Bivirkninger

De fleste tåler behandlingen med colchicin uden problemer. Dog kan der forekomme bivirkninger. De hyppigste er gener fra maven i form af diarré, mavesmerter, kvalme eller opkastning. Disse bivirkninger er normalt udtryk for overdosering og svinder ved pause i behandlingen. Oftest kan colchicin tåles i en lavere dosis.

Sjældent ses påvirkning af nyrer, lever eller knoglemarv. Dette kontrolleres via blodprøverne. Du kan læse en samlet oversigt over bivirkninger i indlægssedlen, som ligger i æsken med colchicin.



Forholdsregler når du er i behandling med colchicin

Rejser

Vi anbefaler, at du kontakter dit forsikringsselskab forud for udlandsrejser, når du er i behandling med colchicin.

Øvrigt

Der forventes ikke pauser i behandlingen. Du bør også fortsætte behandlingen ved anden sygdom (som fx feber).

Colchicin og anden medicin

Flere andre lægemidler kan øge din risiko for at få bivirkninger, hvis du tager dem sammen med colchicin. Det drejer sig bl.a. om:

- Visse kolesterolsænkende midler (fx simvastatin)
- Visse typer antibiotika (fx clarithromycin)
- Verapamil (mod hjertesygdom)
- Ciclosporin (ved organtransplantation)

Vi anbefaler, at du taler med din læge om at bruge anden medicin sammen med colchicin.

Smertestillende medicin

Du må gerne tage smertestillende medicin som f.eks. paracetamol og ibuprofen sammen med colchicin.

Graviditet og amning

Bør ikke benyttes af gravide eller ammende.

Hvis du ønsker at blive gravid, anbefaler vi at du planlægger graviditeten i samråd med din reumatolog.

Blodprøvekontrol

Regelmæssig blodprøvekontrol er som regel nødvendig, når du er i længerevarende behandling med colchicin. Ved blodprøverne kontrolleres bl.a. funktionen af din lever og nyrer.

Blodprøveresultaterne bliver set, og du bliver efterfølgende kontaktet, hvis der er behov for det.

Tilskud

Der er generelt tilskud til behandlingen.

Yderligere spørgsmål?

Er du i tvivl eller har yderligere spørgsmål, er Du altid velkommen til at kontakte dit behandlingssted.

Derudover henviser vi til indlægssedlen i pakken med medicin.